

PRELEVEMENT SANGUIN

Votre médecin vous a prescrit une ordonnance nécessitant un prélèvement sanguin.
Avant de réaliser ce prélèvement, certaines conditions sont à respecter.

1) Examens nécessitant d'être à jeun (parmi les plus demandés):

- Bilan lipidique (cholestérol, triglycérides)
- Glycémie
- Fer (uniquement le matin)
- Calcium
- Phosphore
- Acide urique
- Cortisol (prélèvement entre 7h et 9h)
- Prolactine (20 minutes de repos dans la salle d'attente seront à respecter)
- Cross Laps (avant 9h)
- Cryoglobulines
- Fimax
- Folates
- Homocystéine
- Testostérone biodisponible

Liste non exhaustive : se renseigner auprès du secrétariat pour des examens spécialisés

Etre à jeun signifie : ne pas avoir mangé depuis 10 à 12 heures .
Vous pouvez boire de l'eau plate si besoin
(ne pas boire de café, de thé ou de boisson sucrée)

2) Heure de prélèvement :

Certains examens nécessitent d'être prélevés à heure fixe :

- Dosage du cortisol et ACTH: le matin entre 7 et 9 heures, l'après midi entre 15 et 17 heures
- Dosage du Cross laps : avant 9 heures le matin
- Dosage du Fer sérique : uniquement le matin

3) Dosage d'un médicament

Le prélèvement doit se faire juste avant la prise du médicament.

Veuillez noter pour mémoire la date et l'heure de la dernière prise ainsi que la posologie (une feuille de renseignement propre au dosage de médicament sera remplie par le préleveur au moment du prélèvement)

La surveillance du traitement par une héparine de bas poids moléculaire telle que Lovenox se fait par un dosage d'anti Xa qui est prélevé 4 à 6 heures après l'injection du médicament.